n.° ~~6~~ 35.

Observation

Sur le detachement du perioste de la Surface anterieure de présque toutes les Cotes accompagné du decolement où desunion des portions Cartilagineuses de ces memes Cotes, causé vraysemblablement par un vice Scorbutique.

Par m. La coste, g.r eleve de bicêtre

L'observation rapportée par l'illustre M.r Petit pag. 369. du 2.e vol. de Son traité des maladies des os m'avoit présque entierement detourné du desir que j'avois de presenter cellecy a l'academie royale de Chirurgie. Mais quoique ces deux Cas ayent entre eux beaucoup d'analogie, j'ai cru cependant que le dernier ne Seroit pas indigne d'etre consideré, et que s'il ne paroissoit pas absolument Singulier, dumoins pourroit il paroitre extraordinaire.

Le 20. fevrier de cette année, je fis transporter dans le lieu consacré a nos exercices anatomiques un Cadavre qui se trouva etre celuy d'un jeune homme agé d'environ 21. an, Sur lequel je manoeuvrai diverses operations de chirurgie, je voulus ensuitte luy ouvrir la poitrine, parceque l'ayant reconnu, je me Souvins qu'il en souffroit considerablem.t etant malade. divisant donc a cet effet les tegumens

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 41 n° 75

je sentis que le sternum conjointement avec les —
parties cartilagineuses des cotes n'opposoient par la —
resistance qu'ils auroient naturellement dû faire, qu'au
contraire ces parties s'enfonçoient considerablement
dans l'interieur de la poitrine. Cela me paroissant
extraordinaire, je tatai sur les parties laterales, et je —
reconnûs aussitot manifestement, malgré l'embonpoint
du cadavre, que les portions cartilagineuses de la plupart
des cotes, tant des vrayes que des fausses de chaque coté —
etoient separées des osseuses. je m'imaginai d'abord
que cela pouvoit avoir eté occasionné par quelque
mauvais traitement qu'on auroit pû faire au —
cadavre. je Continuai l'incision, et aprés avoir
enlevé les tegumens, et les muscles grands pectoraux,
je vis effectivement les portions cartilagineuses —
des cinq vrayes cotes inferieures, de meme que celles
de trois ou quatre superieures des fausses de chaque
coté entierement separées de leurs portions —
osseuses, positivement dans leurs jonctions. —
je trouvai aussi le ~~pa~~rioste de toutes ces Cotes —
totalement detaché dans leur partie anterieure, a
plus ou moins de distance de leur longueur. les Cavités
qui resultoient de ce detachement etoient extremement
remplies d'une humeur assés liquide, et d'une couleur —
grisatre plus epaisse cependant et de couleur noiratre

dans la pluspart des espaces formés par l'éloignement des parties cartilagineuses des osseuses;

Tout cela examiné je tachai de rechercher ensuitte la cause d'un aussi enorme desastre dans ces parties; n'ayant pas lieu de la soupçonner externe, je m'appliquai a faire des perquisitions sur toute l'habitude du Cadavre qui etoit generalement d'une couleur de jaune brun, de meme que le blanc des yeux, et que je crûs parconsequent etre mort d'une espece d'ictere. je ne reconnus d'autres simptomes qui pûssent me decouvrir la cause interieure que quelques legers tubercules ronds, durs, et d'une couleur noiratre dispersés ça et la sur les extremités inferieures, ce qui me donna lieu de conclurre malgré l'absence de tout autre simptome que le malade etoit infecté du vice scorbutique; quoyquil n'y eut aucune mauvaise disposition aux geneives.

peut etre y avoit il un vice venerien, quoyquil ne se soit manifesté aucun des signes ordinaires.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE